



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**Календулы настойка Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-№(001385)-(РГ-RU)

**Торговое наименование:** Календулы настойка Реневал

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** календулы лекарственной цветков настойка

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав**

*Для получения настойки используют:*

Календулы лекарственной цветков – 100 г

Этанола (спирта этилового) 70 % – до получения 1000 мл настойки

**Описание**

Прозрачная жидкость от зеленовато-желтого до желтовато-коричневого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.



### **Фармакологические свойства**

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

### **Показания к применению**

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно – для полоскания при воспалительных заболеваниях горла (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит).

Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите в составе комплексной терапии.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

При применении внутрь: острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения; калькулезный холецистит; беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

### **С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Наружное и местное применение препарата возможно, с учетом ожидаемой пользы для матери и возможного риска для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

### **Способ применения и дозы**

Наружно, местно, внутрь.

Участки с поверхностным поражением кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона.

При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек.

Для полоскания полости рта и горла используют 1/2 - 1 стакана водного раствора настойки. Курс лечения – 1-2 недели.

Внутрь, за 15 минут до еды применяют по 10-20 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек). При приеме внутрь – изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.



### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Календулы настойка усиливает действие других противовоспалительных и желчегонных средств (в частности препаратов на основе ромашки и тысячелистника).

*При одновременном применении с любыми другими лекарственными средствами следует сообщить врачу.*

### **Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе – 0,7 г.

*Если симптомы сохраняются без улучшения более одной недели при местном применении препарата и более двух недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу.*

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Настойка.

По 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена низкого давления, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Тубик-капельницу или флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621,

Новосибирская обл., Сузунский район,

рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.



Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

**Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей**

*Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства*

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18а.

*Фасовщик, упаковщик*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18а.

*Выпускающий контроль качества*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [prenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:prenzii@pfk-obnovlenie.ru)