



## ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Муравьиный спирт Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-006296

**Торговое наименование:** Муравьиный спирт Реневал

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** муравьиная

**[Муравьиный спирт: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)**

кислота

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения спиртовой

**Состав**

*Действующее вещество:*

Муравьиная кислота — 1,4 г

*Вспомогательное вещество:*

этанол (спирт этиловый) 70 % — 98,6 г

**Описание**

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** местнораздражающее средство.

**Код АТХ:** M02AX10

**Фармакологические свойства**

Местнораздражающее средство, расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, уменьшает воспаление и боль.

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии при невралгии, миалгии, артралгии в качестве отвлекающего средства.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

*Беременность*

Применение лекарственного препарата во время беременности противопоказано.

*Период грудного вскармливания*

Применение лекарственного препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

**Способ применения и дозы**

Наружно.

Растирают кожу в болезненной области. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 1-2 недель. При необходимости курс можно повторять.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или

появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции, гиперемия, зуд кожи.

*Важно сообщать о развитии нежелательных реакций с целью обеспечения непрерывного мониторинга отношения пользы и риска лекарственного препарата. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. Медицинские работники сообщают о нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях.*

### **Передозировка**

При применении в соответствии с инструкцией передозировка маловероятна.

При случайном применении внутрь возможны следующие симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, шок, в том числе с летальным исходом.

*Лечение:* следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости – симптоматическая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, могут образовываться новые соединения и наблюдаться денатурация белковых компонентов.

### **Особые указания**

Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки и на мокнущие раны. При попадании препарата в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения необходимо вымыть руки.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение лекарственного препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Раствор для наружного применения спиртовой, 1,4 %.

*В случае фасовки (упаковки) на производственной площадке по адресу: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80*

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

*В случае фасовки (упаковки) на производственной площадке по адресу: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18*

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (флакон в пачке).

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Держатель/Владелец регистрационного удостоверения:**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

#### **Производитель:**

*Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства:*

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80

*Фасовщик, упаковщик*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18

*Выпускающий контроль качества*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»  
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»  
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,  
e-mail: [prenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:prenzii@pfk-obnovlenie.ru)