



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Фуразолидон Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-005381

**Торговое наименование:** Фуразолидон Реневал

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** фуразолидон

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав на одну таблетку**

*Действующее вещество:* фуразолидон – 50,0 мг; *вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, лактозы моногидрат, сахароза (сахар), кросповидон, повидон К 30, кальция стеарат, полисорбат 80 (твин 80)

**Описание**

[Фуразолидон Реневал: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Круглые плоскоцилиндрические таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с фаской.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное и противопротозойное средство – нитрофуран.

**Код АТХ:** G01AX06

#### **Фармакологические свойства**

##### ***Фармакодинамика***

Противомикробное и противопротозойное средство, производное нитрофуранов. Активен в отношении следующих микроорганизмов: *Trichomonas* spp., *Giardia lamblia*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Salmonella typhi*, *Salmonella paratyphi*, *Staphylococcus* spp. Слабо влияет на возбудителей гнойной и анаэробной инфекции. Устойчивость микроорганизмов развивается медленно. Блокирует моноаминоксидазу.

Нитрофураны нарушают процессы клеточного дыхания микроорганизмов, подавляют цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса), а также ингибируют биосинтез нуклеиновых кислот микроорганизмов, в результате чего происходит разрушение их оболочки или цитоплазматической мембраны. В результате действия нитрофуранов микроорганизмы выделяют меньше токсинов, в связи с чем улучшение общего состояния пациента возможно еще до выраженного подавления роста микрофлоры. В отличие от многих других противомикробных лекарственных средств они не только не угнетают, а даже активируют иммунную систему организма (повышают титр комплемента и способность лейкоцитов фагоцитировать микроорганизмы).

##### ***Фармакокинетика***

###### *Абсорбция*

Хорошо абсорбируется при приеме внутрь.

###### *Распределение*

На фоне воспаления мозговых оболочек в ликворе создаются концентрации, равные таковым в плазме крови.

###### *Метаболизм*

Быстро и интенсивно метаболизируется в основном в печени с образованием фармакологически неактивного метаболита (аминопроизводное).

###### *Выведение*

Выводится в основном почками (65 %). Частично выводится с желчью, достигая высоких концентраций в просвете кишечника, что позволяет применять его при кишечных инфекциях.

При почечной недостаточности фуразолидон кумулирует в крови вследствие замедления выведения.

#### **Показания к применению**

Острая бактериальная и протозойная диарея, дизентерия, паратифы, лямблиоз.



### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к фуразолидону, компонентам препарата, к группе нитрофуранов; терминальная стадия хронической почечной недостаточности; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы; дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 3 лет.

### **С осторожностью**

Хроническая почечная недостаточность, заболевания печени и нервной системы, пожилой возраст. При почечной недостаточности фуразолидон не создает терапевтических концентраций в моче, кумулируется и может оказать токсическое действие.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Препарат в период беременности противопоказан.

При необходимости применения препарата в период лактации, грудное вскармливание необходимо прекратить.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, после еды, запивая большим количеством жидкости (100-200 мл).

*При лечении паратифа, дизентерии, острой бактериальной и протозойной диареи:*

- *взрослым* – по 100-150 мг (2-3 таблетки) 4 раза в сутки на протяжении 5-10 дней (продолжительность приема зависит от характера и тяжести патологического процесса).
  - *детям от 3 лет* – 10 мг/кг массы тела в сутки (суточную дозу распределяют на 3-4 приема).
- Препарат Фуразолидон Реневал не рекомендуется принимать более 10 дней.

*При лечении лямблиоза:*

- *взрослым* – по 100 мг (2 таблетки) 4 раза в день;
- *детям от 3 лет* – в дозе 10 мг/кг массы тела в сутки (суточную дозу распределяют на 3-4 приема).

Для взрослых: высшая разовая доза – 200 мг, суточная – 800 мг.

*Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.*

*Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

### **Побочное действие**

[Фуразолидон Реневал: скачать инструкцию по применению на официальном сайте  
производителя](#)



*Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:* лейкопения, агранулоцитоз, гемолиз у лиц с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

*Нарушения со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности (включая снижение артериального давления, крапивница, лихорадка, артралгия, кореподобная сыпь), кожный зуд, сыпь, в том числе пятнисто-папулезная.

*Нарушения со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, периферическая нейропатия.

*Нарушения со стороны сосудов:* ортостатическая гипотензия, снижение артериального давления.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* боль в животе, тошнота, рвота, диарея, анорексия, колит, проктит, анальный зуд, стафилококковый энтерит.

*Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:* нарушение функции печени, холестаза.

*Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:* нарушение функции почек.

*Общие расстройства и нарушения в месте введения:* гипогликемия, темно-желтое окрашивание мочи, слабость, недомогание, дисульфирамоподобная реакция («прилив» крови к лицу, незначительное повышение температуры, одышка, чувство сдавливания в грудной клетке).

При длительном применении – неврит.

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

### **Передозировка**

*Симптомы:* острый токсический гепатит, гематотоксичность, нейротоксичность (полиневрит).

*Лечение:* отмена лекарственного препарата, прием большого количества жидкости, симптоматическая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Фуразолидон в сочетании с этанолом может привести к развитию сульфирамоподобных реакций, в связи с чем одновременный их прием не рекомендуется.

При одновременном применении фуразолидона с ингибиторами моноаминоксидазы, симпатомиметиками, трициклическими антидепрессантами и пищевыми продуктами, содержащими тирамин, возникает риск резкого повышения артериального давления, в связи с чем их одновременный прием не рекомендуется.

Аминогликозиды и тетрациклины усиливают противомикробные свойства препарата Фуразолидон Реневал.

Фуразолидон увеличивает угнетение кроветворения на фоне хлорамфеникола и ристомицина.

Лекарственные средства, подщелачивающие мочу (антациды, содержащие кальций и магний, ингибиторы карбоангидразы, цитраты, натрия гидрокарбонат) снижают эффект, а подкисляющие

[Фуразолидон Реневал: скачать инструкцию по применению на официальном сайте](#)

[производителя](#)



(аммония хлорид, кальция хлорид, соляная кислота, аскорбиновая кислота, метионин) – повышают эффект препарата Фуразолидон Реневал.

*Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.*

#### **Особые указания**

У людей пожилого возраста необходимо применять с осторожностью, в связи с возможными изменениями функции почек (может потребоваться уменьшение дозы).

При исходной патологии печени возрастает риск гепатотоксического действия.

В связи с риском дисульфирамоподобных реакций, во время терапии фуразолидоном и в течение 4 дней после ее прекращения принимать этанол не рекомендуется. Не применяется при инфекциях мочевыводящих путей.

Избегать употребления продуктов, содержащих тирамин (сыр, пиво, вино, фасоль, копчености, крепкий кофе, сливки, маринованная сельдь) и другие сосудосуживающие амины, так как возникает риск развития гипертонического криза.

Риск периферических полинейропатий повышается при анемии, сахарном диабете, нарушениях электролитного баланса, гиповитаминозах В. С целью профилактики требуется назначение витаминов группы В.

Содержит 10,00 мг сахарозы на 1 таблетку, что в пересчете на разовую дозу (2-3 таблетки) составляет 0,002-0,003 ХЕ, на суточную дозу препарата – 0,012 ХЕ, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не следует применять во время работы лицам, которые управляют транспортными средствами и работают с потенциально опасными механизмами, из-за возможности снижения концентрации внимания.

#### **Форма выпуска**

Таблетки, 50 мг.

По 10, 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1, 2 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток или 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 14 таблеток с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

В пачке при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

[Фуразолидон Реневал: скачать инструкцию по применению на официальном сайте](#)

[производителя](#)



3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства:*

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

**Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.pfk-obnovlenie.ru](http://www.pfk-obnovlenie.ru)

**Организация, принимающая претензии от потребителей**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)