



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Перекись водорода

Регистрационный номер: ЛП-000082

Торговое название: Перекись водорода.

Международное непатентованное название или группировочное название:
водорода пероксид.

Химическое название:
гидрогенпероксид.

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения.

Состав

Действующее вещество:

Водорода перекись медицинская – от 7,5 до 11 г в зависимости от содержания водорода пероксида в исходном препарате, эквивалентно содержанию водорода пероксида 3 г

Вспомогательные вещества:

Натрия бензоат – 0,05 г

Вода очищенная – до 100 мл

[Перекись водорода: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакологическая группа:

Антисептическое средство.

Код АТХ: [D08AX01]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Антисептическое средство из группы оксидантов. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (белки, кровь, гной).

Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, ангина, тонзиллит, гинекологические заболевания.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

С осторожностью

Декомпенсированные заболевания печени и почек, гипертиреоз, герпетический дерматит.

Применение при беременности и лактации

Применение возможно, если потенциальная польза для матери, превышает возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Для наружного применения применяют 3 % раствор, местно – для полоскания рта и горла, нанесения на слизистые оболочки – 0,25 % раствор (3 % раствор разводят водой в соотношении 1:11). Неразбавленный раствор не применяют для обработки слизистых оболочек.

[Перекись водорода: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата. Тампоны следует держать пинцетом. Возможно струйное орошение раневой поверхности.

Побочное действие

Жжение в момент обработки пораженных участков кожи или слизистых оболочек, аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Особые указания

Не рекомендуется применять препарат под окклюзионные повязки.

Следует избегать попадания в глаза!

Не применять для орошения полостей!

Обработка раны раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и других раневых инфекций.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не изучалось.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения, 3 %.

По 40 мл, 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из смеси полиэтиленов низкого и высокого давления.

По 2 мл, 5 мл, 10 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена высокого давления.

Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления.

Флакон или тубик-капельницу по 25 мл, или 5, 10 тубик-капельниц по 2 мл, 5 мл, 10 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Флаконы с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

[Перекись водорода: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



В пачке при температуре не выше 25 °С (для тубик-капельниц и флаконов в пачке).
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С (для флаконов в групповой упаковке).

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Владелец регистрационного удостоверения, производитель:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес:

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru