



## ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### **Боярышника настойка Реневал**

*Перед применением лекарственного препарата внимательно прочитайте инструкцию.*

*Сохраняйте инструкцию до окончания приема препарата. При возникновении дополнительных вопросов задайте их Вашему лечащему врачу.*

**Регистрационный номер:** ЛП-007803

**Торговое наименование:** Боярышника настойка Реневал

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** боярышника плодов настойка

**Лекарственная форма:** настойка

#### **Состав**

*Для получения настойки используют:*

Боярышника плодов – 100 г

Этанола (спирта этилового) 70 % – достаточное количество для получения 1000 мл



### **Описание**

Прозрачная жидкость от светло-желтого или светло-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** кардиотоническое средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** С01ЕВ04

### **Фармакологические свойства**

Оказывает умеренное кардиотоническое, спазмолитическое, седативное действие.

### **Показания к применению**

Настойку боярышника применяют в комплексной терапии функциональных расстройств сердечной деятельности, кардиалгий, климактерического синдрома, астено-невротических состояний.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

### **С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь.

Взрослым по 20-30 капель 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней.

Детям старше 12 лет – по 10-15 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней.

### **Побочное действие**

В отдельных случаях возможны аллергические реакции (крапивница, зуд), брадикардия (при длительном применении), кишечная колика (при применении натощак); при применении в больших дозах – снижение артериального давления, головокружение, тошнота, рвота, тремор, сонливость.



*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

#### **Передозировка**

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

#### *Лечение*

Симптоматическое.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При совместном применении с сердечными гликозидами (в том числе строфантин, дигоксин) происходит усиление кардиотонического эффекта, с бета-адреноблокаторами – возможно усиление гипотензивного эффекта.

*Если вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Боярышника настойка Реневал проконсультируйтесь с врачом.*

#### **Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,45 г, для детей – 0,23 г; в максимальной суточной дозе препарата для взрослых содержится 1,8 г абсолютного этилового спирта, для детей – 0,9 г абсолютного этилового спирта.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

#### **Форма выпуска**

Настойка.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми из смеси полиэтиленов низкого и высокого давления.

Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.



### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (флакон в пачке).

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун,  
ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

### **Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей**

#### *Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

#### *Адрес места производства*

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18а

#### *Фасовщик, упаковщик*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18а

#### *Выпускающий контроль качества*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80

#### *Организация, принимающая претензии от потребителей*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)