



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Валерианы настойка Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-003501

**Торговое наименование:**

Валерианы настойка Реневал

**Группировочное наименование:** валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка

[Валерианы настойка: скачать инструкцию по применению на официальном сайте  
производителя](#)



**Лекарственная форма:** настойка

**Состав**

*Активный компонент:* валерианы лекарственной корневища с корнями – 200 г;  
*вспомогательное вещество:* этанол (спирт этиловый) 70 % – до получения 1000 мл настойки

**Описание**

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается образование налета на стенках первичной упаковки.

**Фармакотерапевтическая группа:** седативное средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** N05CM09

**Фармакологическое действие**

Настойка валерианы оказывает умеренно выраженный седативный эффект. Действующим началом препарата являются сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, свободная валериановая кислота. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабильно. Облегчает наступление естественного сна. Кроме того, препарат оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру органов желудочно-кишечного тракта, обладает желчегонным действием, повышает секрецию желез желудочно-кишечного тракта.

**Показания к применению**

Повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комплексной терапии – функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы органов желудочно-кишечного тракта.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 1 года).

**С осторожностью**

Хронический энтероколит, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, детский возраст от 1 года.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.



### **Способ применения и дозы**

Внутрь, до приема пищи: взрослым – по 20-30 капель, разведенных в небольшом количестве воды, 3-4 раза в день; детям – по 1 капле на каждый год жизни 1-3 раза в день. Курс лечения – до 4 недель. Повторные курсы возможны после согласования с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны сонливость, слабость, снижение работоспособности (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении – запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение – симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Препарат усиливает действие снотворных, седативных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

### **Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,32 г, в максимальной суточной дозе препарата для взрослых – 1,3 г. В одной капле препарата содержится 0,01 г абсолютного этилового спирта.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Настойка.

По 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена высокой плотности, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.



Каждую тубик-капельницу или флакон темного стекла с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

**Условия хранения**

В пачке при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.  
Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель:**

*Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства:*

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18а.

*Фасовщик, упаковщик*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18а.

*Выпускающий контроль качества*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

**Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии от потребителей:**

*Владелец регистрационного удостоверения:*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ  
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

[Валерианы настойка: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)