



ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению  
лекарственного препарата

## Грамицидин С

**Регистрационный номер:** ЛСР-005761/08

**Торговое наименование:** Грамицидин С

**Лекарственная форма:** таблетки защечные

**Международное непатентованное наименование:** грамицидин С

### Состав

1 таблетка содержит:

**активное вещество:**

грамицидин С в пересчете на активное вещество – 0,0015 г

**вспомогательные вещества:**

кальция стеарат .... – 0,0060 г

лактоза (сахар молочный)– 0,44169 г

сахароза (сахар).... – 0,1482 г

ароматизатор пищевой– 0,00198 г

натрия сахаринат

(сахарин растворимый)– 0,00063 г

**Описание:** таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические с фаской, с риской на одной стороне и маркировкой «R» или без нее – на другой.

[Грамицидин С: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**Фармакотерапевтическая группа:** антибиотик полипептидной структуры.

**Код АТХ:** R02AB30

#### **Фармакологические свойства**

##### **Фармакодинамика**

Противомикробный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки. Препарат уменьшает воспаление, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание.

##### **Фармакокинетика**

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата отсутствуют. Препарат обладает местным действием и практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, что обуславливает практически полное отсутствие системных эффектов.

#### **Показания к применению**

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

- Острый тонзиллит (ангина);
- Фарингит;
- Пародонтоз;
- Гингивит;
- Стоматит.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; период лактации; детский возраст до 4 лет.

#### **С осторожностью**

Беременность; детский возраст от 4 до 12 лет.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

При необходимости применения препарата в период беременности следует проконсультироваться с врачом с целью оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

#### **Способ применения и дозы**

Применять после еды, путем *медленного рассасывания* в полости рта, не разжевывая.

В течение 1-2 часов после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков.

Взрослым и детям старше 12 лет: по 2 таблетки (одну за другой в течение 20-30 минут) 4 раза в день.

Детям от 6 до 12 лет: по 1-2 таблетки 4 раза в день (но не более 7 таблеток в сутки).

Детям от 4 до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в день.

Курс лечения – 5-6 дней.

Применение более 6 дней возможно по рекомендации врача.

#### **Побочное действие**

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

#### **Передозировка**

*Симптомы:* прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать характерные для передозировки других антибиотиков нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта вследствие изменения бактериальной флоры и суперинфекции: тошноту, рвоту, диарею.

*Лечение:* прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

[Грамицидин С: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Грамицидин С усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

**Особые указания**

Таблетки не разжевывать и не проглатывать.

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо учитывать, что каждая таблетка содержит 0,05 хлебных единиц (ХЕ).

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не изучалось.

**Форма выпуска**

Таблетки защечные 1,5 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги упаковочной.

По 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В пачке, в сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

*Адрес места производства:*

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [okk@pfk-obnovlenie.ru](mailto:okk@pfk-obnovlenie.ru)