



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Перекись водорода**

**Регистрационный номер:** ЛП-000082

**Торговое название:** Перекись водорода.

**Международное непатентованное название или группировочное название:**  
водорода пероксид.

**Химическое название:**  
гидрогенпероксид.

**Лекарственная форма:** раствор для местного и наружного применения.

**Состав**

*Действующее вещество:*

Водорода перекись медицинская – от 7,5 до 11 г в зависимости от содержания водорода пероксида в исходном препарате, эквивалентно содержанию водорода пероксида 3 г

*Вспомогательные вещества:*

Натрия бензоат – 0,05 г

Вода очищенная – до 100 мл

[Перекись водорода: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



### **Описание**

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

### **Фармакологическая группа:**

Антисептическое средство.

**Код АТХ:** [D08AX01]

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика**

Антисептическое средство из группы оксидантов. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (белки, кровь, гной).

Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

#### **Фармакокинетика**

Не изучалась.

### **Показания к применению**

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, ангина, тонзиллит, гинекологические заболевания.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность.

### **С осторожностью**

Декомпенсированные заболевания печени и почек, гипертиреоз, герпетический дерматит.

### **Применение при беременности и лактации**

Применение возможно, если потенциальная польза для матери, превышает возможный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Для наружного применения применяют 3 % раствор, местно – для полоскания рта и горла, нанесения на слизистые оболочки – 0,25 % раствор (3 % раствор разводят водой в соотношении 1:11). Неразбавленный раствор не применяют для обработки слизистых оболочек.

[Перекись водорода: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата. Тампоны следует держать пинцетом. Возможно струйное орошение раневой поверхности.

#### **Побочное действие**

Жжение в момент обработки пораженных участков кожи или слизистых оболочек, аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

#### **Передозировка**

Случаев передозировки не зарегистрировано.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

#### **Особые указания**

Не рекомендуется применять препарат под окклюзионные повязки.

Следует избегать попадания в глаза!

Не применять для орошения полостей!

Обработка раны раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и других раневых инфекций.

#### **Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не изучалось.

#### **Форма выпуска**

Раствор для местного и наружного применения, 3 %.

По 40 мл, 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из смеси полиэтиленов низкого и высокого давления.

По 2 мл, 5 мл, 10 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена высокого давления.

Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления.

Флакон или тубик-капельницу по 25 мл, или 5, 10 тубик-капельниц по 2 мл, 5 мл, 10 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Флаконы с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

#### **Условия хранения**

[Перекись водорода: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



В пачке при температуре не выше 25 °С (для тубик-капельниц и флаконов в пачке).  
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С (для флаконов в групповой упаковке).  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес:

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

*Адрес места производства:*

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)