



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## Календулы Настойка

Регистрационный номер: ЛП-005530

Торговое наименование: Календулы настойка

[Календулы настойка: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**Международное непатентованное или группировочное наименование:** календулы лекарственной цветков настойка

**Лекарственная форма:** настойка

#### **Состав**

*Активный компонент:*

Календулы лекарственной цветки  
(ноготков цветки) – 100 г

*Вспомогательное вещество:*

этанол (этиловый спирт) 70 % – до получения 1000 мл настойки

#### **Описание**

Прозрачная жидкость от зеленовато-желтого до желтовато-коричневого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

#### **Фармакологические свойства**

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

#### **Показания к применению**

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно – для полоскания при воспалительных заболеваниях горла (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит).

Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите в составе комплексной терапии.

#### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

При применении внутрь: острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения; калькулезный холецистит; беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

#### **С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

[Календулы настойка: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Наружное и местное применение препарата возможно, с учетом ожидаемой пользы для матери и возможного риска для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

#### **Способ применения и дозы**

Наружно, местно, внутрь.

Участки с поверхностным поражением кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона.

При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек.

Для полоскания полости рта и горла используют 1/2 - 1 стакана водного раствора настойки. Курс лечения – 1-2 недели.

Внутрь, за 15 минут до еды применяют по 10-20 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек). При приеме внутрь – изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

#### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Календулы настойка усиливает действие других противовоспалительных и желчегонных средств (в частности препаратов на основе ромашки и тысячелистника).

*При одновременном применении с любыми другими лекарственными средствами следует сообщить врачу.*

#### **Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе – 0,7 г.

*Если симптомы сохраняются без улучшения более одной недели при местном применении препарата и более двух недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу.*

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

[Календулы настойка: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



### **Форма выпуска**

Настойка.

По 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Тубик-капельницу или флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул.

Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

*Адрес места производства:*

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)