

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ-

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Мукалтин Реневал, 50 мг, таблетки шипучие

Действующее вещество: алтея лекарственного травы

(Althaea officinalis herba) экстракт сухой (экстрагент-вода (3:6-8,6):1)

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 7 дней применения препарата, Вам следует обратиться к врачу.

любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- если у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- для лечения детей младше 12 лет;
- если у Вас глюкозо-галактозная малабсорбция.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Мукалтин Реневал проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства.

Дети и подростки

Не давайте препарат Мукалтин Реневал детям в возрасте до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных по эффективности и безопасности у указанной возрастной группы.

Другие препараты и препарат Мукалтин Реневал

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Мукалтин Реневал можно принимать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Мукалтин Реневал не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беремены или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Мукалтин Реневал не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Прием препарата Мукалтин Реневал.

Всегда применяйте лекарственный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослым по 1–2 таблетке 2–3 раза в день.

Применение у детей и подростков

Детям в возрасте от 12 лет до 18 лет по 1–2 таблетке 2–3 раза в день.

Путь и (или) способ введения

Принимайте препарат внутрь, до еды.

Перед приемом внутрь раззовую дозу препарата (1–2 таблетки) следует

расторвить в 1 стакане теплой воды.

Продолжительность терапии

Курс лечения в среднем составляет 7–14 дней.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Мукалтин Реневал, и для чего его применяют.

2. Очем следует знать перед приемом препарата Мукалтин Реневал.

3. Прием препарата Мукалтин Реневал.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Мукалтин Реневал.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Мукалтин Реневал, и для чего его применяют.

Препарат Мукалтин Реневал является отхаркивающим средством растительного происхождения, представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного.

Показания к применению

Мукалтин Реневал показан к применению взрослым и детям в возрасте от 12 лет до 18 лет при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой и повышенной вязкостью (в том числе трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоктазия, пневмония) – в составе комплексной терапии.

Способ действия препарата Мукалтин Реневал

Препарат обладает отхаркивающим действием. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливается выделение бронхиальными железами жидкого компонента мокроты (вода, электролиты), а также повышается частота колебаний мерцательного эпителия и перистальтика (волнообразное движение стенок) дыхательных бронхов (мельчайших ответвлений бронхов). Мокрота становится обильной, жидкой, ее отделение с кашлем облегчается.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 7 дней применения препарата, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Мукалтин Реневал.

Противопоказания

Не применяйте препарат Мукалтин Реневал:

- если у Вас есть аллергия на экстракт травы алтея лекарственного или

Если Вы приняли препарата Мукалтин Реневал больше, чем следовало

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Если Вы забыли принять препарат Мукалтин Реневал

Если Вы забыли принять препарат Мукалтин Реневал вовремя, пропустите эту дозу и примите следующую в запланированное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Вместо этого дождитесь времени следующего приема препарата.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции.

Подобно всем лекарственным препаратам Мукалтин Реневал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно появление аллергических реакций, редко – диспептических явлений (тошнота). Необходимо прекратить прием препарата и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550-99-03

e-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Мукалтин Реневал.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе полипропиленовой после слов «годен до», на картонной пачке после «годен до» или «EXP». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

В оригинальной упаковке (тубе) с целью защиты от влаги при температуре ниже 25 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию/водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Препарат Мукалтин Реневал содержит

Действующим веществом является алтея лекарственного травы (*Althaea officinalis herba*) экстракт сухой (экстрагент – вода (3,6-8,6):1).

Каждая таблетка содержит 50 мг алтея лекарственного травы (*Althaea officinalis herba*) экстракта сухого (экстрагент – вода (3,6-8,6):1).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия гидрокарбонат, лимонная кислота безводная, адипиновая кислота, пovidон K30.

Внешний вид препарата Мукалтин Реневал и содержимое упаковки

Таблетки шипучие.

Таблетки шипучие

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от светло-серого до коричневато-сероватого или серовато-коричневатого цвета с вкраплениями, с характерным запахом, с фаской. Допускается наличие мраморности и шерховатости.

Приготовленный раствор

Прозрачный или с легкой опалесценцией раствор от светло-сероватого до коричневато-сероватого или серовато-желтого или серовато-коричневатого цвета с характерным запахом.

По 10, 20 таблеток в тубу полипропиленовую, укупоренную крышкой пластимассовой со встроенным силиконом и контролем первого вскрытия. На тубу наклеивается этикетку самоклеящуюся.

1 тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью «Треугольник» (ООО «Треугольник»)

Юридический адрес: 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Станционная, дом 30А, корпус 15, помещение 48.

Тел./факс: 8 (383) 350-03-10.

Производитель

Выпускающий контроль качества

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обратиться к представителю держателя регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Тел./факс: 8 (380) 200-09-95.

e-mail: pretenzii@pk-obnovlenie.ru

Листок-вкладыш пересмотрен