

# ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению  
препарата

# Калия перманганат Реневал

**Регистрационный номер:** ЛП-№(006488)-(РГ-RU)

**Торговое наименование:** Калия перманганат  
Реневал

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** калия перманганат.

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения.

## Состав

*Действующее вещество:*

Калия перманганат – 3 г, 5 г, 15 г

## Описание

Темно-фиолетовые или красно-фиолетовые кристаллы, или мелкий кристаллический порошок с металлическим блеском.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

**Код АТХ:** D08AX06.

## Фармакологические свойства

### Фармакодинамика

Антисептическое средство. При соприкосновении с органическими веществами выделяет атомарный кислород. Образующийся при восстановлении калия перманганата марганца оксид образует с белками комплексные соединения – альбуминаты (за счет этого калия перманганат в малых концентрациях оказывает вяжущее, а в концентрированных растворах – раздражающее, прижигающее и дубящее действие). Обладает также дезодорирующим эффектом. Эффективен при лечении ожогов и язв.

Способность калия перманганата обезвреживать некоторые яды лежит в основе использования его растворов для промывания желудка при отравлениях.

При попадании внутрь всасывается, оказывая гематотоксическое действие (приводит к развитию метгемоглобинемии).

## Фармакокинетика

Не изучалось.

### Показания к применению

Смазывание язвенных и ожоговых поверхностей – инфицированные раны, язвы и ожоги кожи.

Полоскание полости рта и ротоглотки – при инфекционно-воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта и ротоглотки (в т.ч. ангины).

Для промывания и спринцеваний при гинекологических и урологических заболеваниях – кольпиты и уретриты.

Для промываний – желудка при отравлениях, вызванных приемом внутрь алкалоидов (морфин, аконитин, никотин), синильной кислоты, фосфором, хинином.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к калия перманганату.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

После консультации с врачом возможно применение препарата, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### Способ применения и дозы

Наружно, местно. В виде водных растворов для промывания ран (0,1–0,5%), для полоскания рта и горла (0,01–0,1%), для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей (2–5%), для спринцеваний (0,02–0,1%) в гинекологической и урологической практике, а также промывания желудка при отравлениях.

Для растворения – несколько кристаллов помещают в стакан с теплой водой и перемешивают, раствор используют только свежеприготовленным.

### Побочное действие

Аллергические реакции, при использовании концентрированных растворов – ожоги и раздражения.

## Передозировка

Симптомы: резкая боль в полости рта, по ходу пищевода, в животе, рвота, диарея; слизистая оболочка полости рта и глотки – отечная, темно-коричневого, фиолетового цвета, возможен отек гортани, развитие механической асфиксии, ожогового шока, двигательного возбуждения, судорог, явлений паркинсонизма, геморрагического колита, нефропатии, гепатопатии. При пониженной кислотности желудочного сока возможно развитие метгемоглобинемии с выраженным цианозом и одышкой. Смертельная доза для детей около 3 г, для взрослых 0,3–0,5 г/кг. Лечение: метиленовый синий (50 мл 1% раствора), аскорбиновая кислота (в/в – 30 мл 5% раствора), цианокобаламин – до 1 мг, пиридоксин (в/м – 3 мл 5% раствора).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Химически не совместим с некоторыми органическими веществами (уголь, сахар, танин) и легко окисляющимися веществами – может произойти взрыв.

## Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения.

По 3 г, 5 г, 15 г во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пластмассовыми крышками с лопатками или без лопаток.

По 3 г, 5 г в пакеты из пленки полиэтиленовой.

На флаконы, пакеты наклеивают этикетки самоклеящиеся.

Каждый флакон по 3 г, 5 г, 15 г или пакет по 3 г, 5 г с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

## Условия хранения

Препарат относится к Перечню лекарственных

средств для медицинского применения, подлежащих количественному учету.

При температуре не выше 25 °С.

## Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

## Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

## Владелец регистрационного удостоверения:

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

## Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:

### Производитель

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

### Адрес места производства:

Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18

### Фасовщик, упаковщик

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18

### Выпускающий контроль качества

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

### Организация, принимающая претензии от потребителей

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)



RENEWAL