

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению
лекарственного препарата

Таблетки от кашля

Регистрационный номер: ЛП-003245

Торговое наименование:

Таблетки от кашля

Международное непатентованное или группировочное наименование:

(Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат])

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку:

Активные вещества:

Термопсиса ланцетного травы порошок..... – 6,7 мг

Натрия гидрокарбонат – 250,0 мг

Вспомогательные вещества:

Крахмал картофельный..... – 27,9 мг

Тальк..... – 5,4 мг

Масса таблетки – 290,0 мг

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от зеленовато-серого до коричневатого-серого цвета с фаской. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа:

отхаркивающее средство.

Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез. Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин и термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах,

рвотный центры.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

Фармакокинетика

Компоненты препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводятся из организма почками, слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.

Показания к применению

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; детский возраст до 12 лет; беременность и период грудного вскармливания. Не следует назначать препарат при легочных заболеваниях со склонностью к кровохарканью (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Прием препарата противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым – по 1 таблетке 3 раза в день, детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-5 дней. Необходимость проведения повторного курса лечения определяется врачом.

Максимальная разовая доза для взрослых (в пересчете на термопсис) – 0,1 г

(14 таблеток), максимальная суточная доза – 0,3 г (42 таблетки).

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие лекарственные препараты могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.

Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение разжиженной мокроты.

Особые указания

Для улучшения разжижения и отделения мокроты во время лечения рекомендуется обильное теплое питье.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги упаковочной с полиэтиленовым покрытием.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и

фольги алюминиевой печатной лакированной.

2, 3 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

20 контурных безъячейковых или контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона (Для стационаров).

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Владелец регистрационного удостоверения, производитель:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятюкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,
e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru