

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Прополиса настойка Реневал

Регистрационный номер: ЛП-№(001380)-(РГ-РУ)

Торговое наименование: Прополиса настойка
Реневал

**Международное непатентованное или
группировочное наименование:** прополис

Лекарственная форма: настойка для ингаляций,
местного и наружного применения

Состав

Для получения настойки используют:

Активный компонент:

Прополис – 100 г

Вспомогательное вещество:

Спирт этиловый (этанол) 80 % – до получения
1000 мл настойки

Описание

Прозрачная жидкость от желтовато-коричне-
вого до красновато-коричневого цвета с
характерным запахом. Допускается зеленоватый
оттенек.

Фармакотерапевтическая группа: прочие
лечебные средства.

Код АТХ: V03AX

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное и раноза-
живляющее действие.

Показания к применению

Прополиса настойка Реневал показана к
применению у взрослых в возрасте от 18
лет при:

- микротравмах;
- поверхностных повреждениях кожных
покровов и слизистых оболочек;
- отитах;
- фарингитах;
- тонзиллитах;
- заболеваниях пародонта.

Противопоказания

• Гиперчувствительность к прополису, продуктам
пчеловодства или к любому из вспомогательных
веществ;

- поллинозы;
- острая экзема;
- детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период
грудного вскармливания возможно, если
ожидаемая польза для матери превышает
потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, ингаляционно.

Участки с поверхностными повреждениями
кожных покровов (микротравмами) обра-
батывают тампоном, смоченным настойкой
прополиса, 1–3 раза в день.

При хронических гнойных отитах после
тщательной очистки от гноя в ухо вводят
тампон, пропитанный настойкой прополи-
са, на 1–2 мин 2–3 раза в день или по
1–2 капли в ухо 3–4 раза в день.

При хроническом фарингите и тонзил-
лите настойкой прополиса смазывают
миндалины 1–2 раза в день в течение
8–15 дней.

Для ингаляций используют водно-спирто-
вой раствор настойки прополиса, приго-
товленный в соотношении 1:20 (1 часть
настойки прополиса разведенной в 20
частях воды). Курс лечения 1–2 ингаляции
в день в течение 7–10 дней.

При заболеваниях пародонта настойку
прополиса вводят на турундах в пародон-
тальные карманы на 5 минут после глубо-
кого кюретажа.

При повреждениях слизистой оболочки
полости рта водно-спиртовой раствор
настойки прополиса (15 мл настойки на
1/2 стакана теплой воды) применяют для
полосканий 4–5 раз в день в течение 3–4
дней.

*Применяйте препарат согласно тем
показаниям, тому способу применения и в
тех дозах, которые указаны в инструкции.*

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (зуд, покрас-
нение кожи, сыпь), кратковременное ощущение
жжения в месте нанесения.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном нанесении препарата возможно усиление побочных эффектов. При случайном проглатывании проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и другое).

Форма выпуска

Настойка для ингаляций, местного и наружного применения.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления и укупоренные крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления, или крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления.

На флаконы наклеивают этикетки самоклеящиеся.

Флакон с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Российская Федерация
Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.
Интернет: www.renewal.ru

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Производитель:

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18а.

Фасовщик, упаковщик

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18а.

Выпускающий контроль качества

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru