



## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению  
лекарственного препарата

## Нафтизин

Регистрационный номер: ЛС-001313

Торговое название: Нафтизин

Международное непатентованное название: нафазолин

Химическое название: 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол нитрат

[Нафтизин: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**Лекарственная форма:** капли назальные

**Состав на 1 л**

*Активное вещество:*

Нафазолин..... – 0,5 г и – 1 г

*Вспомогательные вещества:*

борная кислота..... – 20 г

вода очищенная..... – до 1 л

**Описание**

Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** противоконгестивное средство – альфа-адреномиметик.

**Код АТХ:** R01AA08

**Фармакологическое действие**

Сосудосуживающее средство. Возбуждает альфа<sub>1</sub>- и альфа<sub>2</sub>-адренорецепторы, обладает противоотечным действием. Сосудосуживающий эффект проявляется при местной аппликации на слизистой оболочке носа. При ринитах облегчает носовое дыхание, уменьшая приток крови к венозным синусам.

**Фармакокинетика**

Сосудосуживающий эффект наступает через несколько минут и продолжается в течение нескольких часов.

**Показания к применению**

При острых ринитах, аллергических ринитах, для облегчения риноскопии, для остановки носовых кровотечений.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность; артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, тиреотоксикоз, детский возраст (до 1 года), хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет; одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после окончания их применения.

**Применение при беременности и в период лактации**

Не рекомендуется применение препарата при беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы**

При ринитах назначают в каждый носовой ход взрослым по 1-3 капли 0,05 % - 0,1 % препарата 3-4 раза в сутки, детям от 1 года до 6 лет назначают по 1-2 капли 0,05 % препарата, детям от 6 до 15 лет – по 2 капли 1-3 раза в день.

При носовых кровотечениях применяют тампоны, смоченные 0,05 % препаратом.

Для облегчения риноскопии – после очистки носа в каждый носовой ход закапать 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % препарате и оставить на 1-2 мин.

**Побочное действие**

Тошнота, тахикардия, головная боль, повышение АД, реактивная гиперемия, набухание слизистой оболочки полости носа. Раздражение, при применении более 1 недели – отек слизистой оболочки полости носа, атрофический ринит.

**Передозировка**

[Нафтизин: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Симптомы: снижение температуры тела, брадикардия, повышение АД.

Лечение: симптоматическое.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не следует применять одновременно с ингибиторами MAO или в течение 14 дней после окончания их применения.

#### **Особые указания**

Может оказывать резорбтивное действие.

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.

#### **Форма выпуска**

Капли назальные 0,05 % и 0,1 %.

По 2 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 10 мл, 15 мл, 20 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена или из полимерных материалов.

Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают навинчиваемыми крышками из полимерных материалов.

На тубик-капельницы наклеивают этикетки самоклеящиеся или текст этикетки наносят непосредственно на тубик-капельницу методом каплеструйной печати.

1 тубик-капельницу по 2 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл или 2, 5, 10 тубик-капельниц по 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

20 тубик-капельниц по 10 мл, 15 мл, 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона.

Тубик-капельницы по 10 мл, 15 мл, 20 мл с инструкциями по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров).

Тубик-капельницы по 10 мл, 15 мл, 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.pfk-obnovlenie.ru](http://www.pfk-obnovlenie.ru)

*Адрес места производства:*

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [okk@pfk-obnovlenie.ru](mailto:okk@pfk-obnovlenie.ru)

[Нафтизин: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ  
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95