



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**Валидол Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛС-001117

**Торговое наименование:** Валидол Реневал

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** левоментола раствор в ментил изовалерате

**Лекарственная форма:** таблетки подъязычные

**Состав на одну таблетку:**

*активное вещество:*

левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) - 0,060 г

*вспомогательные вещества:*

сахароза (сахар)..- 1,157 г

кальция стеарат ..- 0,006 г

**Описание:** круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской и риской, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом ментола. Допускаются сероватые вкрапления.

**Фармакотерапевтическая группа:** коронародилатирующее средство рефлекторного действия.

Код АТХ С01ЕХ

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика**

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и высвобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формирования болевых ощущений.

#### **Фармакокинетика**

При приеме под язык терапевтический эффект наступает, в среднем, через 5 минут, при этом до 70 % препарата высвобождается в течение 3 минут.

### **Показания к применению**

Функциональные кардиалгии, синдром «укачивания» (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни).

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (т.к. препарат содержит сахарозу).

### **С осторожностью**

Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом (препарат содержит сахарозу). 1 таблетка содержит хлебных единиц – 0,096-0,116 ХЕ (0,106 ХЕ).

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

В период беременности и кормления грудью Валидол назначают лишь в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает возможное отрицательное влияние препарата на плод и грудного ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Валидол назначают под язык. Таблетку следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день. Суточная кратность и продолжительность приема валидола определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или, когда у отдельных больных в ближайшие 5 минут после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.



### **Побочное действие**

При длительном приеме валидола могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

### **Передозировка**

Головная боль, тошнота, возбужденное состояние, снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы. В случае передозировки необходимо отменить препарат и назначить симптоматическую терапию.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

При совместном применении с другими лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременное применение препарата с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

### **Сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В связи с возможностью проявления побочного действия при длительном применении препарата способность управлять транспортным средством или механизмами может снижаться.

### **Форма выпуска**

Таблетки подъязычные, 60 мг.

По 8 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3, 4 контурные ячейковые упаковки по 8 таблеток с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.



**Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621,

Новосибирская обл., Сузунский район,

рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

**Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей**

*Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства*

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)