



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного препарата

Калия перманганат

Регистрационный номер: P N003203/01

Торговое название: калия перманганат

Международное непатентованное название или группировочное название:
калия перманганат

[Калия перманганат: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Химическое название:

калий марганцевокислый

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения

Состав:

калия перманганат– 3 г, 5 г, 15 г

Описание

Темно-фиолетовые или красно-фиолетовые кристаллы, или мелкий кристаллический порошок с металлическим блеском.

Фармакотерапевтическая группа:

антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX06

Фармакологическое действие

Антисептическое средство. При соприкосновении с органическими веществами выделяет атомарный кислород. Образующийся при восстановлении калия перманганата марганца оксид образует с белками комплексные соединения – альбуминаты (за счет этого калия перманганат в малых концентрациях оказывает вяжущее, а в концентрированных раст-ворах – раздражающее, прижигающее и дубящее действие). Обладает также дезодорирующим эффектом. Эффективен при лечении ожогов и язв. Способность калия перманганата обезвреживать некоторые яды лежит в основе использования его растворов для промывания желудка при отравлениях.

При попадании внутрь всасывается, оказывая гематотоксическое действие (приводит к развитию метгемоглобинемии).

Препарат относится к списку № 4 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Показания

Смазывание язвенных и ожоговых поверхностей – инфицированные раны, язвы и ожоги кожи.

Полоскание полости рта и ротоглотки – при инфекционно-воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта и ротоглотки (в т.ч. ангины).

Для промывания и спринцеваний при гинекологических и урологических заболеваниях – кольпиты и уретриты.

Для промываний – желудка при отравлениях, вызванных приемом внутрь алкалоидов (морфин, аконитин, никотин), синильной кислотой, фосфором, хинином.

[Калия перманганат: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Противопоказания

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы

Наружно, местно. В виде водных растворов для промывания ран (0,1-0,5 %), для полоскания рта и горла (0,01-0,1 %), для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей (2-5 %), для спринцеваний (0,02-0,1 %) в гинекологической и урологической практике, а также промывания желудка при отравлениях.

Для растворения – несколько кристаллов помещают в стакан с теплой водой и перемешивают, раствор используют только свежеприготовленным.

Побочное действие

Аллергические реакции, при использовании концентрированных растворов – ожоги и раздражения.

Передозировка

Симптомы: резкая боль в полости рта, по ходу пищевода, в животе, рвота, диарея; слизистая оболочка полости рта и глотки – отечная, темно-коричневого, фиолетового цвета, возможен отек гортани, развитие механической асфиксии, ожогового шока, двигательного возбуждения, судорог, явлений паркинсонизма, геморрагического колита, нефропатии, гепатопатии. При пониженной кислотности желудочного сока возможно развитие метгемоглобинемии с выраженным цианозом и одышкой. Смертельная доза для детей около 3 г, для взрослых 0,3-0,5 г/кг.

Лечение: метиленовый синий (50 мл 1 % раствора), аскорбиновая кислота (в/в – 30 мл 5 % раствора), цианокобаламин – до 1 мг, пиридоксин (в/м – 3 мл 5 % раствора).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Химически не совместим с некоторыми органическими веществами (уголь, сахар, танин) и легко окисляющимися веществами – может произойти взрыв.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения.

По 3 г, 5 г, 15 г во флаконы стеклянные с винтовой горловиной, укупоренные пластмассовыми крышками с лопатками или без лопаток.

По 3 г, 5 г в пакеты из пленки полиэтиленовой.

На флаконы, пакеты наклеивают этикетки самоклеящиеся.

Каждый флакон, пакет с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Список IV прекурсоров. В сухом месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.



Срок годности

5 лет.

Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Владелец регистрационного удостоверения, производитель:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621,

Новосибирская обл., Сузунский р-н,

рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru