

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата
для медицинского применения

Валидол с глюкозой

Регистрационный номер: ЛС-001312

Торговое название препарата:

Валидол с глюкозой

**Международное непатентованное название
или группировочное название:** левоментола
раствор в ментил изовалерате + декстроза

Лекарственная форма: таблетки подъязычные

Состав на одну таблетку:

активное вещество:

левоментола раствор в ментил изовалерате
(валидол) - 0,060 г
декстрозы (глюкозы) моногидрат - 0,188 г
вспомогательные вещества:
сахара (сахар) - 0,544 г
кальция стеарат - 0,008 г

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской и риской, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом ментола. Допускаются сероватые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: коронародилатирующее средство рефлекторного действия.

Код АТХ C01EX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Валидол оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, а также умеренное рефлекторное сосудорасширяющее действие, обусловленное раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и высвобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, гистамина, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки ротовой полости), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект, в среднем, наступает через

5 минут, при этом до 70 % препарата высвобождается в течение 3 минут.

Декстрозы (глюкозы) моногидрат, поступая в ткани, фосфорилируется, превращаясь в глюкозо-6-фосфат, который активно участвует в различных процессах обмена веществ в организме и в метаболических процессах.

Фармакокинетика

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта, метаболизируется в печени, выводится с мочой в виде глюкуронидов.

Декстрозы моногидрат полностью усваивается организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания к применению

Функциональная кардиалгия, неврозы, синдром «укачивания» (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение толерантности к углеводам. Дефицит сахарозы/изомальтозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью

Сахарный диабет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В период беременности и кормления грудью Валидол с глюкозой назначают лишь в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает возможное отрицательное влияние препарата на плод и грудного ребенка.

Способ применения и дозы

Валидол с глюкозой назначают под язык. Таблетку следует держать во рту под языком до полного растворения. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день. При недостаточно выраженном эффекте

или, когда у отдельных больных в ближайшие 5 минут после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Побочное действие

При длительном приеме изредка могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Передозировка

Симптомы: головная боль, тошнота, возбужденное состояние, снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы.

Лечение: отмена препарата, назначение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При совместном применении с другими лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременное применение препарата с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В связи с возможностью проявления побочного действия при длительном применении препарата способность управлять транспортным средством или механизмами может снижаться.

Особые указания

В 1 таблетке содержится 188 мг декстрозы моногидрата (глюкозы моногидрата), 544 мг сахара (сахарозы), что соответствует 0,067 ХЕ, что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Форма выпуска

Таблетки подъязычные.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаков-

ку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

По 20 контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку картонную.

Контурные ячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Владелец регистрационного удостоверения, производитель:

ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633623, Новосибирская область, р. п. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18. Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru