



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению
лекарственного препарата

Метилурацил

Регистрационный номер: ЛС-002574

Торговое наименование: Метилурацил

Группировочное наименование: диоксометилтетрагидропиримидин

Химическое название: 6-Метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2,4-дион

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Диоксометилтетрагидро-
пиримидин– 500 мг

Вспомогательные вещества:

крахмал картофельный– 130 мг

повидон-К30 – 49 мг

тальк – 14 мг

[Метилурацил: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



кальция стеарат – 7 мг

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской, с риской на одной стороне и гравировкой «R» или без нее – на другой.

Фармакотерапевтическая группа:

репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: L03AX

Фармакологическое действие

Обладает анаболической активностью. Оказывает гемопозитическое, лейкопозитическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в том числе в быстропролиферирующих клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта), стимулирует эритро- и лейкопоз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

Показания к применению

Лейкопения (легкие формы, в том числе возникшие в результате химиотерапии злокачественных новообразований, при рентгено- и лучевой терапии), агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, анемия, тромбоцитопения, интоксикация бензолом, лучевая болезнь, реконвалесценция (после тяжелых инфекций), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в составе комбинированной терапии), вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, гепатит, панкреатит.

Противопоказания

Гиперчувствительность, лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогранулематоз, гемобластозы, злокачественные новообразования костного мозга, детский возраст – до 3 лет.

Применение при беременности и лактации

В период беременности и в период лактации следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время или после еды, взрослым – по 500 мг 4 раза в сутки (при необходимости – до 6 раз в сутки, максимальная суточная доза – 3 г); детям от 3 до 8 лет – по 250 мг 3 раза в сутки (максимальная суточная доза – 750 мг), старше 8 лет – до 14 лет по 250-500 мг 3 раза в сутки (максимальная суточная доза – 1,5 г). Курс при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта – 30-40 дней; в других случаях может быть менее продолжительным.

[Метилурацил: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Побочное действие

Аллергические реакции, головная боль, головокружение, изжога.

Передозировка

При клиническом применении случаев передозировки до этого времени не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает противолучевое действие цистамина.

Форма выпуска

Таблетки, 500 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 5, 10 контурных ячейковых упаковок с таблетками с гравировкой «R» или без нее с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

20 контурных ячейковых упаковок с таблетками без гравировки «R» с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Владелец регистрационного удостоверения, производитель:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

[Метилурацил: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,
e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru