



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению
лекарственного препарата

Мукалтин

Регистрационный номер: ЛС-000973

Торговое название препарата: Мукалтин.

Группировочное название: Алтея лекарственного травы экстракт.

Лекарственная форма: таблетки.

Состав на одну таблетку:

активное вещество:

алтея лекарственного травы
экстракт - 0,05 г

вспомогательные вещества: до получения таблетки массой 0,3 г

натрия гидрокарбонат - 0,087 г

винная кислота - 0,160 г

кальция стеарат - 0,003 г

Описание

Таблетки от светло-серого до коричневатого-серого цвета с вкраплениями, со специфическим запахом, плоскоцилиндрические с фаской и риской.

[Мукалтин: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA

Фармакологические свойства

Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхов в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

Показания к применению

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой повышенной вязкости (в т.ч. трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Детский возраст до 12 лет.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно по рекомендации врача.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым и детям от 12 лет по 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

Побочное действие

Аллергические реакции, диспепсические явления.

Передозировка

О случаях передозировки препаратом нет информации.

Взаимодействие

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Форма выпуска

Таблетки 50 мг.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги упаковочной.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги упаковочной.

По 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 20 контурных безъячейковых или контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона.

Контурные безъячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

[Мукалтин: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Владелец регистрационного удостоверения, производитель:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru

[Мукалтин: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)