

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата
для медицинского применения

Борная кислота

Регистрационный номер: ЛП-000099

банной перепонки.

Торговое название: Борная кислота

Противопоказания

Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность, перфорация барабанной перепонки, беременность, детский возраст, период лактации.

МНН или группировочное название:
Борная кислота &

Лекарственная форма: раствор для местного применения спиртовой

Состав на 1000 мл:

Активное вещество:

Борная кислота..... – 30 г,

Вспомогательное вещество:

Этанол (этиловый спирт) 70% – до 1000 мл

Способ применения и дозы

Местно. При остром и хроническом отите по 3-5 капель наносят на турунду и вводят в наружный слуховой проход 2-3 раза в день. Курс лечения не должен превышать 3-5 дней.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа:
антисептическое средство.

Побочное действие

Местные реакции: зуд, жжение, гиперемия кожи наружного слухового прохода. Аллергические реакции.

Код АТХ: D08AD

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Фармакологическое действие

Антисептическое средство; коагулирует белки (в т.ч. ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной стенки.

Фармакокинетика

Хорошо проникает через кожу и слизистые оболочки; медленно выводится и может накапливаться в органах и тканях. Выводится почками – 50 % (в течение 12 ч), остальное количество – в течение 5-7 дней.

Передозировка

Симптомы острой интоксикации (при случайном приеме внутрь): тошнота, рвота, диарея, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, гиперпирексия, эритематозные высыпания с последующей десквамацией (возможен летальный исход в течение 5-7 дней), нарушение функций почек и печени (в т.ч. желтуха), циркулятор-

Показания к применению

Отит наружный (острый и хронический) без повреждения бара-

ный коллапс, шок, в т.ч. с летальным исходом.

Лечение: симптоматическое. Переливание крови, гемо- и перитонеальный диализ.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Избегать попадания на слизистые оболочки.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для местного применения спиртовой 3 %.

По 10 мл, 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов. По 10 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов с пипеткой.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Тубик-капельницу или флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Владелец регистрационного удостоверения, производитель:

ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633623,

Новосибирская область, р. п. Сузун,

ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск,

ул. Станционная, д. 80,

e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru