



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**  
**Таурин Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-N(002332)-(РГ-RU)

**Торговое наименование:** Таурин Реневал

**Международное непатентованное наименование:** таурин

**Лекарственная форма:** капли глазные

**Состав**

*Действующее вещество:*

Таурин – 40 мг

*Вспомогательные вещества:*

метилпарагидроксибензоат – 1 мг

гидроксиэтилцеллюлоза – 2 мг

вода для инъекций – до 1 мл

**Описание**

Прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** препараты, применяемые в офтальмологии; другие препараты, применяемые в офтальмологии.

**Код АТХ:** S01XA

## **Фармакологические свойства**

### **Фармакодинамика**

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе метаболизма цистеина.

Оказывает ретинопротекторное (при субконъюнктивальном введении) и метаболическое действие.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления катионов калия и кальция, улучшения условий проведения нервного импульса.

### **Фармакокинетика**

При местном применении системная абсорбция низкая.

## **Показания к применению**

Препарат применяют в составе комплексной терапии при дистрофии роговицы, катаракте (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая), травме роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов).

Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с местными  $\beta$ -адреноблокаторами (для улучшения оттока внутриглазной жидкости).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ препарата, детский возраст (до 18 лет).

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Отсутствуют достаточные сведения о безопасности применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания. Возможно применение таурина для лечения во время беременности и в период грудного вскармливания по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект для матери превышает риск развития возможных побочных эффектов для плода и ребенка.

## **Способ применения и дозы**

При катаракте препарат назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.

При открытоугольной глаукоме (в сочетании с местными  $\beta$ -адреноблокаторами) по 1-2 капли 2 раза в день за 15-20 минут до назначения одного из местных  $\beta$ -адреноблокаторов, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

*Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

### **Порядок работы с тубик-капельницей с клапаном:**



1. Повернуть клапан и открыть тубик-капельницу (необходимо убедиться, что раствор находится в нижней части тубик-капельницы).

2. Нажать на тубик-капельницу и закапать необходимое количество препарата в глаза (глаз).

3. Надавить на клапан и закрыть тубик-капельницу после каждой процедуры.

### **Порядок работы с тубик-капельницей с винтовой горловиной:**



1. Докрутить винтовую крышку тюбик-капельницы до упора.
2. Острие, находящееся под крышечкой, проколет верхушку тюбик-капельницы.
3. Открыть тюбик-капельницу, осторожно, не касаясь пальцами верхушки тюбик-капельницы.
4. Нажать на тюбик-капельницу, зафиксировав между большим и указательным пальцами одной руки. Закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза. Необходимо избегать контактов верхушки открытой тюбик-капельницы с поверхностью глаза и руками.
5. После использования плотно закрыть винтовую крышку по часовой стрелке.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции.

*Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

### **Передозировка**

Данные о передозировке отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Возможно совместное применение таурина с тимололом. Случаев негативного лекарственного взаимодействия таурина с другими препаратами, применяющимися в офтальмологии, не описано.

У пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отмечено увеличение гипотензивного действия  $\beta$ -адреноблокаторов (бутиламиногидроксипропксифеноксиметил метилоксадиазола или тимолола и других) в случае совместного применения с таурином.

### **Особые указания**

Консервант, содержащийся в препарате, может оказывать раздражающее действие на глаз при ношении контактных линз, поэтому любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15 минут после него. При необходимости одновременного применения других офтальмологических лекарственных средств (глазные капли и другие), интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Глазные мази необходимо применять в последнюю очередь.

После вскрытия использовать в течение 90 суток.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Данные о возможности отрицательного влияния таурина при офтальмологическом применении на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами и механизмами) отсутствуют.



### **Форма выпуска**

Капли глазные, 4 %.

По 1 мл, 1,5 мл, 2 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной, изготовленные из полиэтилена высокого давления.

Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

1 тубик-капельницу по 1 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 5, 10 тубик-капельниц по 1 мл, 1,5 мл, 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

### **Условия хранения**

В пачке при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия использовать в течение 90 суток.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

### **Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей**

#### *Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

#### *Адрес места производства*

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

#### *Организация, принимающая претензии от потребителей*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)